





(二)煎藥法

既臥中病，服亦得法，宜乎病瘳。愈矣，然而服之不得其法，亦難圖效。蓋病情有不同，服法亦因圖之而異，如用藥而變通之，如溫之，各隨其宜，劑而變通之，如通利之劑，欲其化積滯而下達也，宜于空腹，如宣肺之藥，欲其散上焦而通竅也，宜于飯後，發散之劑，欲其風寒而外解也，必使熱服，他如吐血宜早服，補益宜乎晝夜，久服宜乎九散，種種服法，均有至理，余今之編此，咸置之不顧，亦無怪其病之不難愈也。

(四) 調養法

調養之法，貴乎適當，每有病後，初愈，調養失宜，以致復發者，比比然也。古之所謂勞復食復者，皆由于此。故調養之法，不可不詳，飲食之起居之適宜，空氣之清潔，飲食之清潔，皆為調養中之最重要者，滋陰之品，生陰之物，以及一切不易消化之食物，

（侯名）

近世界人口有過剩之患，普山經  
夫人已先言之、矧在我國、實  
業不振、生活程度日高、限制生  
育之法、尤不可不講、節育之利  
益、言之、其利有三、(一)足  
以維持產母健康也、婦女生產頻  
繁、則強者轉弱、弱者益虛、而  
百病叢生、(二)足以維持夫婦愛  
情也、兒女多則煩惱亦多、夫婦  
間之愛情、每因之淡薄、(三)足  
以維持家庭經濟也、食指多則開

(三) 一個奇治跌傷之

余學醫十載、而未嘗顯達、官乎  
遠近、惟無事間人笑君小儒徒爾  
之過、然昔者朋黨記之以實本  
余(袁君自稱)嘗配時、喜舊魚虫  
數十、日以聚鬻爲樂、杭棹後市  
所求於斯、中有老翁、陳其姓、  
以門嬖嫌毒其家、故經臨時豐、  
必以購虫與老翁終、暇時後  
效、云嘗在歌浦、設攤於丹桂巷  
有老婦張君、獨一突寄其攤、  
有戲笑金鉅之藝員、突寄其攤、  
老翁極力欲泣、而張君適至、  
員僞名聚友、今夕各串於此、不  
傷及內嬖、勢頗沉重、因蟋蟀  
仲圭曰、蟋蟀能通房帑、浴盆閉  
實前開、困思奇方妙法、見  
計、病虫之治應屬、蜚蟲之數  
計、正宜旁搜博覽、上而垂垂  
先生(續)

不事務所去早寒時等語皆實事也

十六號 電話西五八二三號

及子死腹中、胞衣不

婦人科之達生編，確有種種救濟方法，言子精詳，可採用者，亦復不少。鄙人處居，遇有叩門乞復生藥者，即細詢臨產狀況，而面授以達生編救濟法，屢奏奇效。百無一失，預防產難法，(一)睡，(二)忍，試疼與正產，不可不知若疼一陣，慢一陣，謂之試疼，千萬不可遽盆太早，仍要靜睡，直待疼一陣，緊一陣，一連疼致六七陣，方是正產，即預備伺候，一切危險等，均可避免。

救濟橫生倒產法，不必驚慌，但令產婦安睡，用當歸五錢，川芎三錢，酒三分，水七分同煎服之，生胎即安，死胎亦下。

救濟子死腹中法，當歸一兩，川

溲血者、小溲夾血也、血淋者、

**淋病之概要**（許升靈）  
原因：疳爲小兒之病名，其症面黃肌瘦，多由飲食積聚於內，滯留中道，膀胱宣化失司，故一宜用歸脾湯引血歸經，一宜用小蓴飲治之。

(風)外感風邪、其咳必喉癢、

(寒)外感寒邪、其咳必頭痛、或痰多色白、  
(燥)其症屬熱、咳時痰必難出、或無痰喉乾、  
(火)其症有二、(一)成肺癰、(二)成肺癰、  
(濕)其症由于食積于脾胃、久之釀成臭物、其氣上沖于肺、故咳時痰必先出、

瘧疾的性質、可是與痢症兩途的

、瘧疾感受時邪，近於天氣方  
或歸罪於傳染媒介的蚊蟲，急愈以  
爲可能成立，但是不可絕對的認爲有  
害於人體。什麼叫做微感之時邪？  
置於隱處了。

陽暑、發爲暑病、病而未清，等到  
少陽半表半裏之間，寒邪大太陽  
又有偏於陽明燥化的、就現成少  
陰有偏於陽明燥化的、就現成少  
陰有偏於陽明燥化的、就現成少  
陰有偏於陽明燥化的、就現成少

同是寒熱往來，但少陽病所必要  
發是有定時的，他病以發作越少越輕  
起越早爲輕，越少越嚴重。（西  
血氣三分之一重六分一重）

行走、喜作坐業、平

中物、客春面與額部、忽患癰症  
延至眉上、經西醫治療半月、癰腫  
愈、而眉不能生、復經西醫用  
電氣治療三星期、效未見、後由  
余延其母以單方、試藥結果、功效